

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SMS - FLORIANÓPOLIS/
ENFERMAGEM**

Título: Administração de Acetato de Lanreotida

Conceito: Solução injetável de liberação prolongada em seringa preenchida, pronta para o uso, contendo 60 mg, 90 mg ou 120 mg de acetato de lanreotida, expresso como lanreotida. Cada embalagem contém uma seringa preenchida com dispositivo retrátil automático de segurança, incluindo agulha em aço inoxidável, e acondicionada em invólucro laminado. É indicado para tratar a acromegalia e sintomas clínicos associados. **(Acetato de Lanreotida. Bula do medicamento)**

VIA SUBCUTÂNEA PROFUNDA

USO ADULTO

- Lanreotida 60 mg
- Lanreotida 90 mg
- Lanreotida 120 mg

Data de implantação: 12/2024	Edição: 001	Codificação: 049
Validade: Indeterminado	Revisão: 001	Página: 1 de 7

Responsáveis

Elaborado por: Bianka Corrêa Inácio COREN/SC 746786	Revisado por: Enfª Franciele Carvalho de Vargas Coren/SC: 620316	Aprovado por: Elizimara Ferreira Siqueira COREN/SC 82888 Responsabilidade Técnica Enfermagem.
--	--	--

1. Objetivos	2. Aplicação	3. Executante
Preparação e a administração com técnica correta, garantindo a segurança do paciente e a eficácia medicamentosa.	Centro de Infusão (Multihospital) e Hospital	Preferencialmente enfermeiro, ou técnico sob supervisão direta

4. Material

- Prescrição do medicamento legível e devidamente assinada e carimbada por prescritor;
- Luvas de procedimento;
- Álcool 70%;
- Algodão ou gaze;
- Esparadrapo ou micropore;
- Garrote
- Bandeja limpa e desinfetada com álcool 70%;
- Medicação (apresentação de seringa preenchida)
- O medicamento deve ser mantido refrigerado antes da aplicação;


5. Descrição do Procedimento/Técnica

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO/TÉCNICA:


1. Aferir sinais vitais do usuário;
2. Realizar a higienização das mãos;
3. Reunir material necessário;
4. Checar na bula do medicamento a via de administração permitida;
5. Verifique a data de validade do medicamento;
6. Verifique dados de identificação do usuário;
7. Verificar receituário junto ao paciente;
8. Separar o material a ser utilizado;
9. Paramentar-se com o uso de EPIs (Equipamentos de proteção individual).

VIA SUBCUTÂNEA PROFUNDA USO ADULTO


1. Verifique a dosagem prescrita na receita;
2. O medicamento apresenta-se em seringa preenchida pronta para a infusão, cheque integridade do material;
3. Retire da refrigeração 30 minutos antes da aplicação;
4. Delimite a região do quadrante superior externo das nádegas para aplicação, realize revezamento dos lados em próximas aplicações




5. Realize a limpeza da região com algodão e álcool 70%



6. Retire o protetor do êmbolo e descarte



7. Retire a tampa da agulha e descarte




8. Estique a pele em volta do local da administração com o polegar e indicador da mão não dominante




9. Insira a agulha em um ângulo de 90° com a mão dominante




10. Aplique a medicação lentamente, o tempo recomendado é de 20 segundos.




11. Retire a agulha sem soltar o êmbolo



12. Após retirar toda a agulha libere a pressão do êmbolo, a agulha irá retrair para dentro do dispositivo protetor, onde ficará bloqueada. Descarte a seringa no lixo perfurocortante



13. Aplique suave pressão no local de administração com um algodão seco ou gaze. Não massageie o local, contraindique compressas.



6. Orientações Gerais

1. Para a minimização da dor é indicado que o medicamento seja retirado da refrigeração 30 minutos antes da aplicação.
2. Possíveis efeitos adversos incluem:
 - a. Distúrbios Cardíacos: bradicardia sinusal
 - b. Distúrbios do Sistema Nervoso Central Comum: vertigem, cefaléia
 - c. Distúrbios do Trato Gastrointestinal: diarreia, fezes amolecidas, dor abdominal, náusea, vômito, constipação, flatulência, distensão abdominal, desconforto abdominal, dispepsia, acolia fecal
 - d. Distúrbios da Pele e Tecido Subcutâneo: alopecia, hipotricose
 - e. Distúrbios Nutricionais e do Metabolismo: hipoglicemia, diabetes mellitus, hiperglicemia
 - f. Distúrbios Vasculares: rubor
 - g. Distúrbios Gerais e do Local de Administração Comum: fadiga, reações no local de administração (dor, massa, endurecimento, nódulo, prurido), astenia
 - h. Distúrbios do Sistema Hepatobiliar: colelitíase, dilatação biliar
 - i. Distúrbios Psiquiátricos: insônia

7. Referências

- 1- CONSULTA REMÉDIOS. Acetato de lanreotida: bula. Disponível em: <https://consultaremedios.com.br/acetato-de-lanreotida/bula>. Acesso em: 27 nov. 2024.
- 2- HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU. POP-GE-003: Administração de medicação por via subcutânea. Disponível em: <https://hcfmb.unesp.br/wp-content/uploads/2023/10/POP-GE-003-ADMINISTRACAO-DE-MEDICACAO-POR-VIA-SUBCUTANEA.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2024.
- 3- NOVA MEDICAMENTOS. Somatuline Autogel: informações para prescritores. Disponível em: https://www.novamedicamentos.com.br/media/catalog/product/s/o/somatuline_autogel_1.pdf. Acesso em: 27 nov. 2024

Elaborado pelos Enfermeiros da CSAE – Comissão Permanente de Sistematização da Assistência de Enfermagem da SMS.



ENFERMAGEM